

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

Số: **3013** /SNN&PTNT-BVTV  
V/v tăng cường phòng chống sâu bệnh  
hại cây trồng vụ Mùa 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày **08** tháng 8 năm 2019

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hiện nay, hầu hết diện tích lúa Mùa trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng, cây ngô đang giai đoạn 3-6 lá đến trổ cờ, một số diện tích đang cho thu hoạch; nhìn chung cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, nắng mưa xen kẽ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh lùn sọc đen phương Nam, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu keo mùa Thu hại ngô,...

Theo dự báo của Chi cục BVTV, trên lúa từ nay đến cuối vụ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 có nguy cơ tăng nhanh về mật độ và phạm vi gây hại; các bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen phương Nam tiếp tục gây hại. Trên ngô, sâu keo mùa Thu tiếp tục gây hại trên ngô giai đoạn từ 3-6 lá cho đến giai đoạn ngô trổ cờ.

Để sản xuất vụ Thu-Mùa đảm bảo về năng suất, sản lượng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện ngay các biện pháp sau đây:

**I. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.**

1.1. Sâu bệnh trên ngô: Thực hiện nghiêm túc thông báo số 51/TB-SNN&PTNT ngày 31/7/2019 về kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Việt Thái tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống sâu keo mùa Thu hại cây trồng tại Thanh Hóa”, trong đó chú ý giai đoạn ngô 3-6 lá nếu phát hiện sâu tuổi 1-3 cần sử dụng các loại thuốc sau để phun: V.K 16WP, 32WP, Biocin 16WP, Clever (150SC, 300WG), Sunset 300WG, IndoGold 150EC, Ebato 160EC, Berry 110EC, Radiant 60SC, Match<sup>®</sup> 050EC,... nếu mật độ sâu quá cao cần phun kép 2 lần cách nhau 7-10 ngày.

1.2. Sâu bệnh trên lúa:

a) Phân công cán bộ chỉ đạo phụ trách các địa bàn, trực tiếp kiểm tra hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn giúp nông dân xác định rõ từng loại sâu bệnh, lựa chọn đúng thuốc đặc hiệu và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng. Cụ thể:

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: tập trung theo dõi rầy trên lúa giai đoạn ôm đòng khi mật độ rầy từ 1000 con/m<sup>2</sup> trở lên chỉ đạo hướng dẫn phun trừ bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Cheestar 50WG, Chess 50WG, CyO Super 200WP, Chatot 600WP, Elsin 10EC,... Chỉ đạo phun kép lần 2 (cách lần 1 từ 3 – 4 ngày) nếu mật độ rầy quá cao. Những ruộng lúa giai đoạn chín sắp đến đở đuôi khi mật độ

trên 1500con/m<sup>2</sup> sử dụng các loại thuốc tiếp xúc như hoạt chất **Fenobucarb** để phun vào phần gốc lúa.

- Đối với sâu cuốn lá lúa 6: Thường xuyên thăm đồng, khi thấy mật độ trên 20 con/m<sup>2</sup> cần chỉ đạo phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Clever 300WG, Altach 5EC, Opulent 150SC, Takumi (20WG, 20SC), Angun 5WG, Sunset 300WG, Dylan 2EC, Fnico 800WG...Không chỉ đạo phun thuốc tràn lan; đồng thời tuyên truyền nông dân trong khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần mang theo bảo hộ lao động và thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng nơi quy định.

- Đối với bệnh lùn sọc đen phương Nam, tập trung theo dõi diễn biến của rầy lưng trắng trên đồng ruộng và những khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, lá xoắn, lóng thân có u sấp, cần nhổ bỏ và gửi mẫu về Chi cục giám định virus lùn sọc đen.

b) Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý các trường hợp kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán kèm thuốc không đúng chủng loại và tăng giá thuốc.

## **2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở.**

a) Chi cục bảo vệ thực vật: Chỉ đạo các Trạm BVTV huyện thường xuyên thăm đồng, dự tính, dự báo kịp thời diễn biến của sâu bệnh nói chung, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu keo mùa Thu/ngô nói riêng, đồng thời hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ hiệu quả. Phân công cán bộ về địa phương chỉ đạo, tăng cường cho các huyện. Giám sát chặt chẽ việc quảng bá, quảng cáo thuốc BVTV trên truyền hình, không để hiện tượng quảng cáo không đúng nội dung, gây hoang mang cho bà con nông dân.

b) Phòng Trồng trọt theo dõi diễn biến thời tiết, sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, đặc biệt là diện tích bị ảnh hưởng của bão số 3 (từ ngày 02-05/8) để phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác chỉ đạo và tổng hợp tình hình báo cáo Giám đốc Sở.

c) Chi cục Thủy lợi chỉ đạo các Công ty khai thác công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước cho lúa trổ, đảm bảo đủ nước cho công tác phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.


d) Trung tâm Khuyến nông chủ trì phối hợp với Chi cục bảo vệ thực vật và Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là sâu keo mùa Thu/ngô.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách để phòng trừ có hiệu quả những sâu bệnh nêu trên, đồng thời, thường xuyên thông tin báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp chỉ đạo. /.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- VP Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh;
- Chi cục BVTV; Chi cục Thủy lợi;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Lưu VT, BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Thái**